

Tema 15

INECUACIONES LINEALES

Las inecuaciones lineales con una incógnita son desigualdades algebraicas (usando $>$, $\geq$, $<$, $\leq$) de primer grado, cuyo conjunto solución suele ser un intervalo de números reales, a menudo infinito. Se resuelven igual que las ecuaciones de primer grado, agrupando términos, pero invirtiendo el sentido de la desigualdad si se multiplica o divide por un número negativo.

Conceptos Clave

- **Forma estándar:** ($ax + b < c$, $ax + b \leq c$, $ax + b > c$ ó $ax + b \geq c$).
- **Signos:** Representan menor, mayor, menor o igual, o mayor o igual.
- **Solución:** No es un solo número, sino un **conjunto de valores** (un intervalo) que satisface la desigualdad.
- **Representación:** Se expresan mediante intervalos (ej. $(2, \infty)$) o gráficamente en la recta numérica

EJEMPLO: $2x - 2 > 8$, despejamos (x), $2x > 8 + 2 \Rightarrow 2x > 10 \Rightarrow x > \frac{10}{2}$, $x > 5$

Solución: $x > 5$, intervalo $(5, \infty)$


Gráficamente.



Ejercicio: $7x + 5x < 2x - 10$, despejamos (x), $7x + 5x - 2x < -10 \Rightarrow 10x < -10$

$x < \frac{10}{10}$, solución: $x < -1$ intervalo: $(-\infty, -1)$


Gráficamente.



Ejercicio: $2(x + 1) - 3(x - 2) \leq x + 6$, resolvemos, $2x + 2 - 3x + 6 \leq x + 6$, $2x - 3x - x \leq 6 - 2 - 6 \Rightarrow 2x - 4x \leq -2$, $-2x \leq -2 \Rightarrow 2x \geq 2$, $x \geq \frac{2}{2}$, $x \geq 1$

Solución: $x \geq 1$. Intervalo; $[1, \infty)$

Gráficamente



EJERCICIOS:

- 1) $4x + 2 < 6x - 3$
- 2) $-3x + 8 > 10$
- 3) $x - 4(x - 7) \leq 16$
- 4) $-x + \frac{2}{3} \geq x + 1$

SISTEMA DE INECUACIONES LINEALES CON UNA INCOGNITA

Un sistema de inecuaciones lineales con una incógnita es un conjunto de dos o más inecuaciones de primer grado que deben cumplirse simultáneamente. Se resuelve despejando la incógnita en cada una, obteniendo intervalos solución y buscando su intersección en la recta numérica. Si los intervalos no se cruzan, el sistema no tiene solución.

Pasos para Resolver el Sistema

1. Resolver individualmente:

Se despeja la incógnita (X) en cada inecuación por separado, siguiendo las reglas de desigualdad (cambiar el sentido al multiplicar/dividir por números negativos).

2. Representación gráfica: Se dibujan los conjuntos solución de cada inecuación en una recta real.

3. Intersección: La solución final es el intervalo o región donde se cruzan o coinciden las soluciones de todas las inecuaciones.

4. Expresar la solución: El resultado se escribe en forma de intervalo, por ejemplo: $[5, 8)$, $(-\infty, 2)$, o como conjunto vacío $\emptyset$ si no hay solución común.


1) Ejemplo:

$$\begin{cases} 4x - 3 \leq 13 & (1) \\ 2x - 1 \geq 1 & (2) \end{cases}$$

Resolvemos (1) $4x - 3 \leq 13$, $4x \leq 13 + 3 \Rightarrow 4x \leq 16$, $x \leq \frac{16}{4}$, $x \leq 4$. $(-\infty, 4]$

Resolvemos (2) $2x - 1 \geq 1$, $2x \geq 1 + 1 \Rightarrow x \geq \frac{2}{2}$, $x \geq 1$ intervalo. $[1, \infty)$

Gráficamente interceptamos intervalos.




2) Resolver:

$$\begin{cases} 5x - 10 > 3x - 2 & (1) \\ 3x + 1 < 2x + 6 & (2) \end{cases}$$

(1) $5x - 10 > 3x - 2$, $5x - 3x > -2 + 10 \Rightarrow 2x > 8$, $x > \frac{8}{2}$, $x > 4 \Rightarrow (4, \infty)$

(2) $3x + 1 < 2x + 6$, $3x - 2x < 6 - 1 \Rightarrow x < 5 \Rightarrow (-\infty, 5)$

Gráficamente interceptamos intervalos



SISTEMA DE INECUACIONES LINEALES CON DOS INCOGNITA

<https://www.youtube.com/watch?v=u9Tuvd0FDlc>

Un sistema de inecuaciones con dos incógnitas involucra dos inecuaciones que contienen dos variables y cuyas soluciones son los pares de valores que satisfacen simultáneamente ambas inecuaciones; para encontrar las soluciones se grafican las inecuaciones en un plano cartesiano y la región de soluciones es la intersección de las regiones definidas por cada una.

Resolver:
$$\begin{cases} 2x + y \leq 3 & (1) \\ x + y \geq 1 & (2) \end{cases}$$

1) Transformamos la desigualdad en igualdad.

$2x + y = 3$ **despejamos (y)**, $y = 3 - 2x$, por ser una ecuación lineal damos tres valores arbitrarios para hallar tres puntos para graficarla

si $x = -1$, sustituimos en $y = 3 - 2x$, $y = 3 - 2(-1)$, $y = 3 + 2$, $y = 5$
p1(-1, 5)

si $x = 0$, sustituimos en $y = 3 - 2x$, $y = 3 - 2(0)$, $y = 3 - 0$, $y = 3$
p2(0, 3)

si $x = 1$, sustituimos en $y = 3 - 2x$, $y = 3 - 2(1)$, $y = 3 - 2$, $y = 1$,
p3(1, 1)


2) Transformamos la desigualdad en igualdad

$x + y = 1$, **despejamos (y)** $y = 1 - x$, por ser una ecuación lineal damos tres valores arbitrarios para hallar tres puntos para graficarla

si $x = -2$, , sustituimos en $y = 1 - x$, $y = 1 + 2$, $y = 3$ **p1(-2, 3)**

Si $x = 0$, , sustituimos en $y = 1 - x$, $y = 1 - 0$, $y = 1$, **p2(0, 1)**

X= 2, sustituimos en $y = 1 - x$, $y = 1 - 2$, $y = -1$, **p3(2, -1)**



Se sustituye el punto (0,0) en cada inecuación para verificar si se cumple la desigualdad. $2x + y \leq 3$, $2(0) + 0 \leq 3$, $0 \leq 3$ **verdadero**, marcamos la zona donde no se cumple la desigualdad.

Se sustituye el punto (0,0) en cada inecuación para verificar si se cumple la desigualdad $x + y \geq 1$, $0 + 0 \geq 1$ **falso** por ser falso marcamos esa zona ya que no se cumple la desigualdad.

La solución del sistema se encuentra en la zona donde no aparece marcada.

Resolver.

$$\begin{cases} 2x + y < 3 & (1) \\ x - 2y \geq -1 & (2) \end{cases}$$

(1) Transformamos la desigualdad en igualdad

$2x + y < 3$ por ser una ecuación lineal damos tres valores arbitrarios para hallar tres puntos para graficarla

$X = -1$. $2x + y = 3$, $2(-1) + y = 3$, $-2 + y = 3$, $y = 3 + 2$, $y = 5$ $p_1(-1, 5)$

$X = 0$. $2x + y = 3$, $2(0) + y = 3$, $0 + y = 3$, $y = 3$ $p_2(0, 3)$

$X = 1$, $2x + y = 3$, $2(1) + y = 3$, $y = 3 - 2$, $y = 1$ $p_3(1, 1)$


(2) Transformamos la desigualdad en igualdad

$x - 2y \geq 3$ por ser una ecuación lineal damos tres valores arbitrarios para hallar tres puntos para graficarla.

$X = -1$ $x - 2y = 3$, $2y = x - 3$, $y = \frac{x-3}{2} \Rightarrow y = -2$ $p_1(-1, -2)$

$X = 0$, $y = \frac{x-3}{2} \Rightarrow y = \frac{0-3}{2} = -\frac{3}{2} = 1,5$, $y = 1,5$ $p_2(0, 1,5)$

$X = 1$, $y = \frac{x-3}{2} = \frac{1-3}{2} = \frac{-2}{2} = -1$, $y = -1$ $p_3(1, -1)$



Se sustituye el punto (0,0) en cada inecuación para verificar si se cumple la desigualdad. $2x + y < -1$, $2(0) + 0 < -1$ **falso**, marcamos la zona donde no se cumple la desigualdad

Se sustituye el punto (0,0) en cada inecuación para verificar si se cumple la desigualdad. $x - 2y \geq -1$, $0 - 2(0) \geq -1$, $0 \geq -1$ **verdadero**, marcamos la zona donde no se cumple la desigualdad
La solución del sistema se encuentra en la zona donde no aparece marcada.

Ejercicio: Resolver

$$1) \begin{cases} 3x + 2y \geq 6 \\ x - y \geq -1 \end{cases}$$

INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

Las inecuaciones con valor absoluto se resuelven eliminando las barras de valor absoluto mediante propiedades específicas. Para $|x| < a$ (con $a > 0$) , se resuelve $-a < x < a$. Para $|x| > a$, se resuelven dos casos separados: $x < -a$ o $x > a$, uniendo luego las soluciones. Estos métodos transforman la inecuación en expresiones algebraicas lineales estándar.


Métodos de Resolución

1) Caso Menor que ($|x| < a$ o $|x| \leq a$):

El valor absoluto está entre dos números, indicando una distancia al cero menor que (a) Se resuelve como una inecuación compuesta:
 $x > -a \wedge x < a$; $-a < x < a$ ó $x \geq -a \wedge x \leq a$; $-a \leq x \leq a$.

Ejemplo: $|x + 3| \leq 6$. Aplicamos la propiedad: $-a \leq x \leq a$.

$|x + 3| \leq 6$. $\Rightarrow -6 \leq x + 3 \leq 6$ despejamos (x), $-3 - 6 \leq x \leq 6 - 3 \Rightarrow -9 \leq x \leq 3$ **solución:** $x \in [-9, 3]$



2) Caso Mayor que ($|x| > a$ o $|x| \geq a$):


La distancia al cero es mayor que (a) , resultando en dos intervalos opuestos. Se resuelve como ($x \leq -a$ ó $x \geq a$) , *Ejemplo:*

$|3x + 3| \geq 9$, Aplicamos la propiedad: ($x \leq -a$ ó $x \geq a$) ,

$$1) \quad 3x + 3 \leq -9 \Rightarrow 3x \leq -9 - 3 \Rightarrow 3x \leq -12, x \leq -4$$

$$2) \quad 3x + 3 \geq 9 \Rightarrow 3x \geq 9 - 3 \Rightarrow 3x \geq 6, x \geq \frac{6}{3}, x \geq 2.$$

Solucion: $(-\infty, -4] \cup [2, \infty)$



1) Valores absolutos en ambos lados ($|X| < |b|$):


Una forma eficiente es elevar ambos miembros al cuadrado, $|x|^2 < |b|^2$, lo que elimina el valor absoluto, ya que $|x|^2 = x^2$.

Ejemplo: $|x - 1| < |x + 2|$, aplicamos la propiedad, $|x|^2 < |b|^2$,

$$|x - 1|^2 < |x + 2|^2 = (x - 1)^2 < (x + 2)^2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 < x^2 + 4x + 4$$

$$x^2 - 2x + 1 - (x^2 + 4x + 4) < 0 \Rightarrow \cancel{x^2} - 2x + 1 - \cancel{x^2} - 4x - 4 < 0$$

$$-6x - 3 < 0 \Rightarrow 6x > -3, x > \frac{-3}{6} \Rightarrow x > -\frac{1}{2} \quad \text{solución: } \left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$$



Ejercicios: $|3x - 2| > x + 4$, aplicamos la propiedad ($|x| > a$ o $|x| \geq a$):


despejamos el modulo, $|3x - 2| > x + 4$, $x < -a \wedge x > a$

$$1) \quad 3x - 2 < -(x + 4) \Rightarrow 3x - 2 < -x - 4 \Rightarrow 3x + x < -4 + 2, 4x < -2, x < -\frac{1}{2}$$

$$\text{Intervalo } \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$$

$$2) \quad 3x - 2 > x + 4 \Rightarrow 3x - x > 4 + 2, 2x > 6 \Rightarrow x > \frac{6}{2}, x > 3, \text{ intervalo } (3, \infty)$$

Gráficamente




$$\text{Solución: } x \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (3, \infty)$$

Ejercicio: $\left|\frac{4x-3}{3}\right| < 5$, aplicamos la propiedad ($|x| < a$ o $|x| \leq a$), $\Rightarrow$

$$-a < x < a. \quad -5 < \frac{4x-3}{3} < 5, 3(-5) < 3\left(\frac{4x-3}{3}\right) < 3(5) \Rightarrow -15 < 4x - 3 < 15$$

$$-15 + 3 < 4x < 15 + 3, -12 < 4x < 18 \Rightarrow \frac{-12}{4} < \frac{4x}{4} < \frac{18}{4}, \Rightarrow -3 < x < \frac{9}{2}$$

Graficamos,



$$\text{Solución: } x \in \left(-3, \frac{9}{2}\right)$$

Ejercicio: $\left|\frac{x-2}{x+3}\right| < 6$, aplicamos propiedad ($|x| < a$ o $|x| \leq a$): $-a < x < a$

$-6 < \frac{x-2}{x+3} < 6$ tenemos dos inecuaciones, resolvemos por separado.


$$1) \quad -6 < \frac{x-2}{x+3} \Rightarrow \frac{x-2}{x+3} + 6 > 0, \frac{x-2+6(x+3)}{x+3} > 0, \frac{x-2+6x+18}{x+3} > 0, \frac{7x+16}{x+3} > 0$$

Determinamos puntos críticos: $\frac{7x+16}{x+3} > 0$

$$7x + 16 = 0, 7x = -16, x = -\frac{16}{7} = -2,2 \Rightarrow x = -2,2$$

$$x + 3 = 0, x = -3$$

Graficamos los puntos críticos,



solucion 1: $(-\infty, -3) \cup (-\frac{16}{7}, \infty)$, es la zona positiva donde cumple la condición > 0

$$2) \frac{x-2}{x+3} < 6, \frac{x-2}{x+3} - 6 < 0, \frac{x-2-6(x+3)}{x+3} < 0, \frac{x-2-6x-18}{x+3} < 0, \frac{-5x-20}{x+3} < 0,$$


Determinamos puntos críticos: $\frac{-5x-20}{x+3} < 0,$

$$-5x - 20 = 0, 5x = -20 \Rightarrow x = -\frac{20}{5} = x = -4$$

$$x + 3 = 0 \quad x = -3$$

Graficamos los puntos críticos,


Solucion 2: $(-\infty, -4) \cup (-3, \infty)$, es la zona negativa donde cumple con la codicion < 0



Solución final es la intercepción de la s1 $\cap$ s2

Solucion 1: $(-\infty, -3) \cup (-\frac{16}{7}, \infty)$,

Solucion 2: $(-\infty, -4) \cup (-3, \infty)$,



Solución: $(-\infty, -4) \cup (-\frac{16}{7}, \infty)$

<https://www.youtube.com/watch?v=sHWLQXSNzGQ>