

TEMA 18

FUNCIONES REALES DE VARIABLE REAL

Una función real de variable real es una regla de correspondencia $f: X \rightarrow Y$ que asocia a cada número real x de un conjunto (X) (dominio) un único número real y de un conjunto (Y) (codominio o rango), denotado como $y = f(x)$. Se denominan así porque tanto el dominio como el conjunto de llegada son subconjuntos de los números reales $\mathbb{R}$.

$$f: \text{Dom } f \rightarrow \mathbb{R} \quad x \rightarrow y=f(x)$$

Donde:

- 1) f : Es la función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, es decir, una regla de correspondencia que asigna a cada valor $\mathbb{R}$ del dominio otro número real
- 2) Dom_f : Es el dominio de definición de la función f , también llamado campo de existencia. Esto es, el conjunto de posibles valores que puede tomar la entrada de la función, es decir, que tienen imagen. Puede ser, o bien el conjunto completo de los reales ($\mathbb{R}$), o bien un subconjunto de este.
- 3) $\mathbb{R}$: Es el codominio de la función, es decir, el conjunto de posibles valores que *podría* tomar la variable dependiente
- 4) x : Es la variable independiente. En este caso, un número real que hace las veces de entrada de la función
- 5) $y=f(x)$: Es la variable dependiente, imagen de x . Es un número real que hace las veces de salida. Para obtener su valor se aplica la función sobre el elemento x

FUNCION LINEAL .

<https://www.youtube.com/watch?v=G-sdulBzvVU>

<https://www.youtube.com/watch?v=jVx1jBJDEpY>

Una función lineal es una función polinómica de primer grado ($y=mx+b$) que representa una línea recta en el plano cartesiano. Su estructura consta de una pendiente (m) que define la inclinación y una ordenada al origen (b) que señala el corte con el eje Y . Estas funciones son siempre crecientes ($m>0$), decrecientes ($m<0$) o constantes ($m=0$)

Ejemplo: **Represente gráficamente la función $f(x)= 4x -2$** , para graficar una función lineal se representa el sistema de ejes cartesiano x , y y luego se construye una tabla de valores dándole valores arbitrarios a la variable independiente (x), para calcular el valor de la variable dependiente (y) a través de la ecuación $f(x)$. para encontrar los puntos de la función $f(x)$.

$$F(x)= 4x - 2 , Df(x) = \mathbb{R} , \text{ la función existe } x \in (-\infty, \infty)$$

$$\text{Rango, } y = 4x - 2 , y + 2 = 4x \rightarrow x = \frac{y+2}{4} , Rf(x) = \mathbb{R} , (-\infty, \infty)$$

tabla


$$y = 4x - 2, \quad f(-1) = 4(-1) - 2 = -4 - 2 = -6$$

$$f(0) = 4(0) - 2 = 0 - 2 = -2$$

$$f(1) = 4(1) - 2 = 4 - 2 = 2$$

X	-1	0	1
Y	-6	-2	2

$$y = 4x - 2 \quad p_1(-1, -6), p_2(0, -2), p_3(1, 2)$$



Ejemplo: Dada $f(x) = -2x + 4$, graficar la función.

$$\text{Dominio } f(x) = -2x + 4 \rightarrow \mathbb{R} \quad x \in (-\infty, \infty)$$

$$\text{Rango } f(x). \quad y = -2x + 4, \text{ despejamos } (x) \quad 2x = 4 - y, \quad x = \frac{4-y}{2}, \quad Rf(x) = \mathbb{R}$$

tabla


$$F(x) = -2x + 4, \quad f(-1) = -2(-1) + 4 = 2 + 4 = 6$$

$$f(0) = -2(0) + 4 = 0 + 4 = 4$$

$$f(1) = -2(1) + 4 = -2 + 4 = 2$$

X	-1	0	1
Y	6	4	2

$$y = -2x + 4 \quad p_1(-1, 6), p_2(0, 4), p_3(1, 2)$$



2) Graficar $f(x) = 3x - 2$

Tabla de valores


X	-1	0	1
y	-5	-2	1

$$f(x) = 3x - 2$$

$$f(-1) = 3(-1) - 2 = -5$$

$$f(0) = 3(0) - 2 = -2$$

$$f(1) = 3(1) - 2 = 1$$



FUNCION CUADRATICA. <https://www.youtube.com/watch?v=YlhOfpREfHE>

Una función cuadrática es un polinomio de segundo grado con la forma $(f(x) = ax^2 + bx + c)$ ($a \neq 0$), cuya representación gráfica es una curva simétrica llamada **parábola**. La parábola se abre hacia arriba si $(a > 0)$ (cóncava) o hacia abajo si $(a < 0)$ (convexa), y su vértice representa el punto máximo o mínimo. $x = \frac{-b}{2a}$ es la coordenada (x) del vértice de la parábola. punto de las coordenadas $V(\frac{-b}{2a}, f(\frac{-b}{2a}))$

Dominio , rango y grafica de $f(x) = 2x^2 - 4x - 1$ $Df(x) = \mathbb{R}$

$y = 2x^2 - 4x - 1$, en la ecuación los coeficientes son: $a = 2$, $b = -4$ y $c = -1$, hallamos las coordenadas del vértice $V(\frac{-b}{2a}, f(\frac{-b}{2a})) \rightarrow V(x, y)$, $x = \frac{-b}{2a}$, $y = f(\frac{-b}{2a})$

$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2(2)} = \frac{4}{4} = 1$ **$x=1$** ; para hallar el valor (y) sustituimos el valor de (x) en la ecuación, $y = f(\frac{-b}{2a}) \rightarrow y = 2(1)^2 - 4(1) - 1 = 2 - 4 - 1 = -3$, **$y=-3$** , el rango se encuentra en el eje (y) a partir de la coordenada (y) del vértice, entonces

$$Rf(x) = (-3, \infty)$$

coordenadas de vértice $v(1, -3)$

construimos una tabla de valores para hallar los puntos que forman la función.


Gráficamente, $f(x) = 2x^2 - 4x - 1$

$$f(-1) = 2(-1)^2 - 4(-1) - 1 = 5$$

X	-1	1	3
Y	5	-3	5

$$f(3) = 2(3)^2 - 4(3) - 1 = 5$$

$a > 0$, $2 > 0 \rightarrow f(x)$ (cóncava), abre hacia arriba.



Graficar $f(x) = x^2 - 8x + 14$

$a=1$, $b=-8$ y $c=14$

$$V\left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right)\right), v(4, -2)$$

$a > 0$, $1 > 0$ $f(x)$ es cóncava abre hacia arriba

$Rf(x)$, $x \in (-\infty, \infty)$

Grafica $f(x) = x^2 - 8x + 14$

Tabla de valores

X	2	3	4	5	6
y	2	-1	-2	-1	2

$$f(x) = x^2 - 8x + 14$$

$$f(3) = 3^2 - 8(3) + 14 = -1$$


$$f(2) = 2^2 - 8(2) + 14 = 2$$

$$f(5) = 5^2 - 8(5) + 14 = -1$$

$$f(6) = 6^2 - 8(6) + 14 = 2$$

Ejercicios : hallar dominio, rango y graficar

a) $f(x) = x^2 - 2x - 3$ b) $f(x) = x^2 - 4x + 2$ c) $f(x) = -x^2 + 2x + 8$



FUNCION EXPONENCIAL <https://www.youtube.com/watch?v=gea1Wz-yMC0>

Una función exponencial es una forma matemática ($f(x) = b^x$), donde la base (b) es una constante positiva ($b > 0$) y distinta de 1 ($b \neq 1$), y la variable independiente (x) es el exponente. Se caracteriza por un crecimiento o decrecimiento muy rápido y constante.

Características Principales:

Dominio: Todos los números reales $(-\infty, \infty)$.

- **Rango:** Todos los números reales positivos $(0, \infty)$, lo que significa que la función nunca es cero o negativa.
- **Base (b):** Si ($b > 1$), la función es creciente (crecimiento exponencial). Si ($0 < b < 1$), la función es decreciente (decaimiento exponencial).
- **Intersección:** Siempre corta al eje (y) en el punto $(0, 1)$, ya que ($b^0 = 1$) (si no hay desplazamientos verticales).
- **Asíntota:** Tiene una asíntota horizontal, generalmente en ($y=0$)

Forma General y Transformaciones:

La forma más general es ($f(x) = a \cdot b^{x-h} + k$).

- **(k):** Determina el desplazamiento vertical y la nueva asíntota horizontal ($y=k$).
- **(a):** Si es negativa, refleja la función respecto al eje (x).
- **Si** se realizan transformaciones al exponente de la función, el Dominio y el Rango siguen siendo: $Df(x): \mathbb{R}$, $Ranf(x): (0, \infty)$

Ejemplo: $f(x) = 2^x$

Dominio $f(x) = \mathbb{R}$

$f(x) = 2^x$ es creciente ya que $a > 0$, $\rightarrow 2 > 0$

formamos la tabla de valores dándole valores arbitrarios a la variable (x) para hallar los valores de la variable (y) y luego graficamos.

Tabla de valores

X	-2	-1	0	1	2
Y	0,25	0,5	1	2	4

 $f(x) = 2^x$

$K=0$, $y=0$ asíntota horizontal

$$y = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0,25$$


$$y = 2^x$$

$$y = 2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$y = 2^0 = 1$$

$$y = 2^1 = 2$$

$$y = 2^2 = 4$$



Ejercicio: $f(x) = -2^{x+1} + 3$, hallar:
dominio y rango y graficar

1) $-2 < 0 \rightarrow a < 0$, $f(x)$ es decreciente

2) $K=3$ la asíntota horizontal pasa por $y=3$

3) Dominio $f(x)$: $\mathbb{R}$

4) Rango $f(x)$: $(3, -\infty)$

Tabla de valores

X	-2	-1	0	1	2
Y	2,5	2	1	1	-5

$$f(x) = -2^{x+1} + 3$$


$$f(-2) = -(2)^{-2+1} + 3 = -(2)^{-1} + 3 = -\frac{1}{2} + 3 = \frac{5}{2} = 2,5$$

$$f(-1) = -(2)^{-1+1} + 3 = -(2)^0 + 3 = -1 + 3 = 2$$

$$f(0) = -(2)^{0+1} + 3 = -(2)^1 + 3 = -2 + 3 = 1$$

$$f(1) = -(2)^{1+1} + 3 = -(2)^2 + 3 = -4 + 3 = -1$$

$$f(2) = -(2)^{2+1} + 3 = -(2)^3 + 3 = -8 + 3 = -5$$



FUNCION LOGARITMO


La función logarítmica, definida como $f(x)=\log_a(x)$, (donde $a>0$ y $a\neq 1$), es la inversa de la función exponencial. Se caracteriza por tener un dominio de números reales positivos $(0,+\infty)$, un rango de todos los números reales, y una asíntota vertical, usualmente en $x=0$. La base (a) determina si la función crece ($a>1$) o decrece ($0<a<1$).

Características Principales

- **Definición:** Es la operación inversa a la potenciación, buscando el exponente (y) al que se debe elevar una base (a) para obtener (x) ($a^y = x$).
- **Dominio:** La función solo está definida para valores positivos de (x) ($x>0$).
- **Rango:** El conjunto de todos los números reales $(-\infty, +\infty)$.
- **Gráfica:** Pasa siempre por el punto $(1,0)$ y tiene una asíntota vertical.
- **Inversa:** Es la función inversa de la exponencial $f(x) = a^x$

Tipos de Logaritmos

1. **Logaritmo Común:** Base 10, expresado como $\log(x)$.
2. **Logaritmo Natural:** Base (e) ≈ 2.718 , expresado como $\ln(x)$



Ejemplo. Hallar $\text{Log}_5 25$. Por definición $2^x = 25 \rightarrow 5^x = 5^2$, por igualdad de potencias con igual base, tenemos $x = 2$ entonces $\text{Log}_5 25 = 2$

2) Hallar el valor de $(x) \log_2(8) = x$ por definición $2^x = 8$, $2^x = 2^3$ por igualdad de potencias con igual base $x = 3$, entonces $\log_2(8) = 3$

Ejercicios: hallar el valor de (x) .

- a) $\text{Log}_{5/2} 125 = x$
- b) $\text{Log}_{10} 0,001 = x$
- c) $\text{Log}_2 32 = x$
- d) $\text{Log}_9 \sqrt[4]{3} = x$
- Expresa los siguientes logaritmos en forma exponencial:
 - a) $\text{Log}_3 27 = 3$
 - b) $\log_2 8 = 3$
 - c) $\log_6 1/36 = -2$

Propiedades Algebraicas de los Logaritmos:

- Logaritmo de un producto: $(\log_a(m \cdot n) = \log_a(m) + \log_a(n))$
- Logaritmo de un cociente: $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a(m) - \log_a(n)$
- Logaritmo de una potencia: $\log_a(m)^n = n \cdot \log_a(m)$
- Logaritmo de la unidad: $\log_a(a) = 1$
- Logaritmo de la base: $\log_a(1) = 0$

Ejercicios:

- a) $\log_a(5x) = \log_a 5 + \log_a x$
- b) $\log_a\left(\frac{9}{5}\right) = \log_a 9 - \log_a 5$
- c) $\log_a x^3 = 3 \log_a x$
- d) $2 \log x + 3 \log y = \log x^2 + \log y^3 = \log(x^2 y^3)$
- e) $\log 2 + \log 3 + \log 4 = \log(2 \cdot 3 \cdot 4) = \log 24$

Resolver:

- a) $\log a + \log b + \log c =$
- b) $\log a - \log x - \log y =$
- c) $\log 10^8 =$
- d) $\log 20 + \log \frac{10}{2} =$

DOMINIO Y RANGO DE UNA FUNCION LOGARITMICA

<https://www.youtube.com/watch?v=C0vUje9Uduc>

El dominio de una función logarítmica básica ($f(x) = \log_b(x)$) son todos los números reales positivos $((0, \infty))$, ya que no existen logaritmos de números negativos o cero. El rango, por otro lado, comprende todos los números reales $(-\infty, \infty)$, lo que significa que la función puede tomar cualquier valor vertical

- **Dominio:** Se determina encontrando los valores de (x) que hacen que el argumento del logaritmo sea mayor que cero $((x > 0))$. Si la función es más compleja, por ejemplo $(f(x) = \log(g(x)))$, se debe resolver $(g(x) > 0)$.
- **Rango:** El rango de cualquier función logarítmica estándar siempre es el conjunto de todos los números reales (R) .
- **Asíntota Vertical:** Existe una asíntota vertical donde el argumento del logaritmo es cero.
- **Relación Inversa:** El dominio de la función logarítmica es el rango de la función exponencial, y su rango es el dominio de la exponencial.

Ejemplo $f(x) = \ln(6x - 2)$, Hallar el dominio

Para $f(x) = \ln(6x - 2)$, el argumento, $6x - 2 > 0$, resolvemos la inecuación , entonces

$$6x - 2 > 0 \rightarrow x > \frac{2}{6} \rightarrow x > \frac{1}{3}$$

$$Df(x): x > \frac{1}{3}, Df(x): \left(\frac{1}{3}, \infty\right)$$

$$Rf(x): x \in R . (-\infty, \infty)$$

Hallamos la Asíntota vertical, $6x - 2 = 0$ resolvemos $6x = 2 \rightarrow x = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, la asíntota vertical para por el punto $x = \frac{1}{3}$

Tabla de valores


X	1	3	5
Y	1,38	2,77	3,33

$$F(x) = \ln(6x - 2)$$

$$F(1) = \ln(6(1) - 2) = \ln(6-2) = \ln 4 = 1,38$$

$$F(3) = \ln(6(3) - 2) = \ln(18-2) = \ln 16 = 2,77$$

$$F(5) = \ln(6(5) - 2) = \ln(30-2) = \ln 28 = 3,33$$



FUNCION IRRACIONAL

Una función irracional es aquella donde la variable independiente (x) se encuentra dentro de un signo de raíz o radical. También se conocen como funciones radicales.

Características Principales

- **Forma general:** Se expresan como $f(x)=\sqrt[n]{g(x)}$, donde $g(x)$ es un polinomio o una función racional.
- **Índice impar:** Si la raíz tiene índice impar (como raíz cúbica), el dominio son todos los números reales ($\mathbb{R}$).
- **Índice par:** Si la raíz tiene índice par (como raíz cuadrada), el radicando debe ser mayor o igual a cero ($g(x)\geq 0$) para obtener valores reales.
- **Gráfica:** Su gráfica suele tener forma de una curva o media parábola desplazada en el plano

Cómo calcular el Dominio

El dominio de una función con índice par se calcula resolviendo una inecuación:

1. Se toma la expresión dentro de la raíz ($g(x)$).
2. Se plantea que sea mayor o igual a cero: $g(x)\geq 0$.
3. Se despeja la variable (x) para hallar los intervalos permitidos

Ejemplo: $f(x) = \sqrt{2x + 4}$

Dominio $f(x)=\sqrt[n]{g(x)} \rightarrow g(x) \geq 0$, $2x + 4 \geq 0$ resolvemos la inecuación, $2x \geq -4$

$$x \geq \frac{-4}{2} \rightarrow x \geq -2 \quad Df(x) = [-2, \infty)$$

El **dominio de la función inversa** (f^{-1}) es exactamente igual al **rango** (o imagen) de la función original ($f(x)$)

Hallamos la función inver de $f(x)= (f^{-1})$, en la función **$f(x) = \sqrt{2x + 4}$** , o **$y = \sqrt{2x + 4}$**

Intercambiamos (x) por (y) y luego despejamos (y) para hallar la función inversa

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{2y + 4} \rightarrow \text{elevamos a la 2 ambos miembros } x^2 = (\sqrt{2y + 4})^2 \rightarrow \\ x^2 &= 2y + 4 \rightarrow x^2 - 4 = 2y \rightarrow y = \frac{x^2 - 4}{2} \text{ inversa de } f(x) \rightarrow y^{-1} = \frac{x^2 - 4}{2} \end{aligned}$$

$Df^{-1} \rightarrow x \in \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$, como **$f(x) = \sqrt{2x + 4}$** esta definida solo para valores de

$x \geq -2$, los valores de (y) siempre serán positivo es decir mayores que cero, entonces el **Rango de $f(x)$ es $[0, \infty)$**

Tabla de valores

X	-2	0	6
Y	0	2	4

$$X = -2 \rightarrow y = \sqrt{2x + 4} = \sqrt{2(-2) + 4}$$

$$Y = \sqrt{-4 + 4} = \sqrt{0} \rightarrow y = 0$$

$$X = 0 \rightarrow y = \sqrt{2x + 4} = \sqrt{2(0) + 4}$$

$$Y = \sqrt{4} \rightarrow y = 2$$

$$X = 6 \rightarrow y = \sqrt{2x + 4} = \sqrt{2(6) + 4}$$

$$Y = \sqrt{12 + 4} = \sqrt{16} \rightarrow y = 4$$

Grafica

