

PROBLEMAS PROPUESTOS 5.7

En los problemas del 1 al 6, mediante un esbozo de la función correspondiente, deducir que las ecuaciones dadas tienen una única raíz. Mediante el método de Newton-Raphson, hallar una aproximación a esta raíz con seis cifras decimales.

1. $x^3 - 4x^2 + 2 = 0$

2. $x^3 - 6x^2 + 9x + 1 = 0$

3. $\cos x = x$

4. $\cos(x^3) = x$

5. $e^{-x} = x$

6. $x \ln x = 1$

En los problemas del 7 al 11, muestre que $f(x) = 0$ tiene una raíz en el intervalo $[a, b]$ verificando que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos diferentes. Luego, mediante el método de Newton-Raphson, hallar una aproximación a esa raíz, con seis cifras decimales.

7. $f(x) = \sin 2x - x + 1$, $a = 1$ y $b = 2$

8. $f(x) = \sin x - e^{-x}$, $a = 2$ y $b = 4$

9. $f(x) = \tan x + x$, $a = 2$ y $b = 3$

10. $f(x) = \tan^{-1} x - \frac{x}{2}$, $a = -3$ y $b = -2$

11. $f(x) = \sin^{-1} x - (x - 1)^2$, $a = 0$, y $b = 1$

En los problemas del 12 y 13, hallar el valor del radical dado con 6 cifras de aproximación.

12. $\sqrt[3]{19}$

13. $\sqrt[6]{2}$